



شناسنامه پمفلت آموزشی	
عنوان	تب خونریزی دهنده کریمه کنگو
تهیه کننده	دفتر آموزش بیمارستان
تایید کننده	کمیته آموزش به بیمار
سال تهیه	۱۴۰۰
سال بازنگری	۱۴۰۳
ناظر کیفی	دکتر فرزانه گرگانی متخصص بیماری های عفونی
منابع	دستورالعمل های معاونت بهداشتی

-ذبح کنندگان در موقع ذبح دام ها باید از وسایل ایمنی شامل کلاه، ماسک، روپوش، پیشبند پلاستیکی، چکمه و دستکش پلاستیکی استفاده نمایند.

-خودداری از له کردن کنه با دست یا روی بدن دام.

-انجام سم پاشی های دوره ای دام و جایگاه،
-جمع آوری کود و فضولات دامی و خارج کردن آن از دامداری،

-بهسازی و اصلاح ساختار دامداری ها توسط دامداران،

-کشتار دام در کشتارگاه های مجاز،
-تهیه گوشت از مراکز مجاز تحت نظارت دامپزشکی،

-خودداری از خرید و مصرف گوشت بازرسی نشده و فاقد مهر و برچسب دامپزشکی،

-پرهیز از خرید و نگهداری هرگونه دام قاچاق و فاقد هویت،

در صورت هرگونه سوال، با شماره بیمارستان (۰۵۴-۳۳۵۸۳۶۹۳) تماس گرفته شود.

برای دریافت مطالب آموزشی بیشتر کد پایین را با گوشی اسکن کنید.



-ذبح حیوان آلوده و یا یک دوره کوتاه پس از ذبح حیوان آلوده (بدنبال تماس با پوست یا لاشه حیوان)

-مصرف گوشت یا جگر تازه خام یا نیم پز دام آلوده

-تماس با خون و بافت بیماران بخصوص در مرحله خونریزی یا انجام هرگونه اعمالی که منجر به تماس انسان با خون، بزاق، ادرار، مدفوع و استفراغ آنها گردد.

آیا با خوردن گوشت می توان به بیماری مبتلا شد؟

این بیماری از راه خوردن گوشت حیوان ذبح شده منتقل نمی شود، مگر اینکه فرد بلافاصله گوشت حیوان تازه ذبح شده را خام بخورد. گوشتی که مهر سازمان دامپزشکی را دارد می توان بدون نگرانی مصرف کرد.

راه های پیشگیری

-خطر انتقال بیماری در طی ذبح یا بلافاصله پس از آن بسیار بالا می باشد، لذا توصیه می شود به مدت ۲۴ ساعت لاشه گوسفند پس از ذبح در یخچال نگهداری شده و سپس با پوشیدن دستکش آن را قطعه قطعه کرده و مورد مصرف قرار گیرد.

-نگهداری گوشت تازه در دمای ۴ درجه سانتی گراد یخچال به مدت ۲۴ و جگر به مدت ۴۸ ساعت.

تب خونریزی دهنده کریمه کنگو (CCHF)

چیست؟

یک بیماری حاد تب‌دار و خون‌ریزی دهنده است که از طریق گزش کنه، تماس با خون یا ترشحات یا لاشه دام و انسان آلوده منتقل می‌شود.



افراد در معرض خطر:

- * دامداران و کشاورزان
- * کارگران کشتارگاه‌ها
- * دامپزشکان
- * خانم‌های خانه‌دار
- * قصابان
- * کارکنان بهداشتی - درمانی

علائم بیماری:

بیماری در حیوانات اهلی هیچگونه علائم مشخصی ندارد.

در انسان علائم بالینی چهار مرحله دارد:

۱- دوره نهفتگی: بستگی به راه ورود ویروس دارد و معمولاً ۱ تا ۳ روز و حداکثر ۱۳ روز می‌باشد.

۲- قبل از خونریزی: ناگهانی و حدود ۱ تا ۷ روز طول می‌کشد. سردرد شدید، تب، لرز، درد عضلانی (بخصوص در پشت و پاها)، گیجی، درد و سفتی گردن، درد چشم، ترس از نور، حالت تهوع، استفراغ بدون ارتباط با غذا خوردن و گلودرد و احتقان ملتحمه در اوایل بیماری که گاهی با اسهال و درد شکم و کاهش اشتها همراه می‌شود. تب معمولاً بین ۳ تا ۱۶ روز طول می‌کشد.

۳- مرحله خونریزی دهنده: مرحله کوتاهی است که به سرعت ایجاد می‌شود و معمولاً در روز ۳ تا ۵ بیماری شروع می‌شود و ۱ تا ۱۰ روز (بطور متوسط ۴ روز) طول می‌کشد. خونریزی در مخاط‌ها و در پوست بخصوص در قسمت بالای بدن و در طول خط زیربغلی و زیر پستان و در محل‌های تزریق و تحت فشار ممکن است ایجاد شود.

ممکن است سایر پدیده‌های خونریزی دهنده مثل مدفوع و ادرار خونی، خونریزی از بینی، لثه و خونریزی از رحم ایجاد شود و گاهی خلط خونی، خونریزی در ملتحمه و گوش‌ها نیز دیده می‌شود.



۴- دوره نقاهت: بیماران از روز دهم وقتی ضایعات پوستی کمرنگ می‌شود، بتدریج بهبودی پیدا می‌کنند.

راه‌های انتقال بیماری

- گزش کنه آلوده یا له کردن آن روی پوست

راه‌های انتقال بیماری CCHF

